



IBD-s betegek multidiszciplináris kezelése a sebészek és radiológusok bevonásával



Szerzők: Dr. Élthes Zsuzsa Bianka^{1,2}, Dr. Pályu Eszter^{1,2}, Dr. Tóth Judit³, Prof. Dr. Berényi Ervin³, Dr. Kanyári Zsolt⁴, Dr. Tóth Dezső⁴, Prof. Dr. Papp Mária^{1,2}, Dr. Palatka Károly^{1,2}

Munkahely:

1. Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék
2. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológia Klinika
3. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Képpalkotó Klinika
4. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Bevezetés





- A gyulladásos bélbetegségek (IBD) incidenciája folyamatosan nő
- Számos kezelési lehetőség ellenére is sok beteg szorul a kórkép lefolyása során műtéti megoldásra.
 - Időzítés
 - Műtét típusa
 - felkészítés

Eredmények

-107 beteggel kapcsolatban történt konzultáció, közülük
62 esetében (58%) azóta megtörtént a műtét.: 58 Crohn (93%) és
4 colitis ulcerosával (6%)
9 Betegnek műtéti időpontja már van

	Férfi	Nő	Összesen
Kor medián (IQR 25-75%)	35	27	62
Kor diagnóziskor medián (IQR 25-75%)	36 (30,5-46)	39 (28-51,5)	37 (30-50)
Betegség fennállásának ideje-év medián (IQR 25-75%)	24,5 (17-25-33,25)	25 (22-29)	25 (18-31)
Betegség fennállásának ideje-év medián (IQR 25-75%)	11,5 (5,5-17,5)	15 (5-22)	13 (5,5-18,5)
Dohányzás	10	10	20
családi kórelőzmény	6	2	8
Lokalizáció: Vastagbél	11	4	15
Vékony+ vastag	15	15	30
Vékonybél + felső GI traktus	5	8	13
Pancoitis	1	0	1
Bal oldali	3	0	3
Korábbi műtét	12	11	23

- 44 (71%) kapott immunmodulánst (AZA), 7 jelenleg is (16%)
 - Diagnózis felállítása és immunmoduláns kezelés bevezetése között eltelt idő: 5 (2-36,5) hónap De volt, akinek 21 év telt el....
- 45 (75%) kapott biológiai kezelést, 34 több, mint egy típusú kezelést (55%)
 - Diagnózis és biológiai kezelés bevezetése között eltelt idő: 63 (23-174) hónap.... (26 év!!!)
- 23 betegnek (37%) korábbi műtét. Előző műtét óta eltelt idő: 52 (17-125,5) hónap
 - 2 hónapon belül műtét technikai gond miatt
 - Leghosszabb idő két műtét között 16 év.




- **Műtétet követően:**
 - CDAI** – jelentős csökkenés, **p = 0.0012**
 - PDAI** – változás nincs, **p = 0.0735**
 - SES-CD** – csökkenés, **p = 0.0497**
 - BMI** – emelkedés, **p = 0.0172**

Módszerek

Módszerek: A Klinikánkon 2023 novemberben megalakult IBD Team (gasztroenterológusok, sebészek és radiológusok együttműködésével) rendszeres megbeszélései során egyeztetett betegek esetében az IBD típusa, betegség fennállásának ideje, választott kezelési stratégia hatékonyságának felmérése.

Eredmények



- 8 (13%) betegnek a biológiai kezelés előtt opus történt
- 11 (18%) robot asszisztált műtét
- 24 (39%) preoperatív hospitalizáció
- 3 betegnél műtétet követően varratelégtelenség, ismételt műtétek, végül exit. (5%)
 - Perioperatív steroid nem befolyásoló tényező (p=1)
- Dohányzás: nem befolyásolta sem a korábbi műtétet, sem az aktuálisan szükséges műtétet, sem a műtétet megelőző hospitalizáció szükségességét

- Betegség fennállásának ideje, korábbi műtét : **p-érték: 0.089**

- **Férfiak vs. Nők:**
 - BMI: p = 0.0016
 - Korábbi műtét előfordulása p = 0.7983
 - CDAI műtét előtt p = 0.8125
 - SES-CD műtét előtt p = 0.8370
 - Műtét előtti hospitalizáció p = 0.2270

Következtetés

Multidiszciplináris ellátás:
-a betegek legmegfelelőbb kezelési stratégiájának gyors és hatékony kiválasztása,
- a személyre szabott gondozás megvalósításában,
- a szövődmények kockázatának csökkentésében
- Életminőség!!!

A közös gondolkodásnak emellett a különböző szemléletek közelítésében, egymás szempontjainak megismerésében, közös tanulásban is jelentős szerepet kap.