



Upadacitinib kezelés valós életbeli tapasztalatai nehezen kezelhető IBD-betegekben

Élthes Zsuzsa Bianka, Pályu Eszter, Lénárt Ágnes, Erdős András, Papp Mária, Palatka Károly
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológia Klinika

Bevezetés

Gyógyszerválasztás nehézségei napjainkban is kihívást jelent az IBD-s betegek kezelése során

Célkitűzés és módszerek:

Retrospektív vizsgálat

Betegség aktivitás


Mellékhatások előfordulását.

Terápiaváltás szükségessége


Eredmények

	n=52
Medián kor (IQR 25-75%)	39 (29-48)
Median kor diagnóziskor (IQR 25-75%)	25 (19-31)
Betegség fennállása: medián év (IQR 25-75%)	15 (10-19)
Dohányzás: n (%)	19 (36)
Családi kórelőzmény: n (%)	18 (35)
Crohn betegség: n (%)	47 (90)
Colitis ulcerosa: n (%)	5 (10)
Korábbi műtét: n (%)	23 (55)
Perianalis betegség: n (%)	19 (40)
Társuló IMID: n (%)	7 (13)
Korábbi JAKi	3 (5)
Korábbi kombinált kezelés	8 (15)
Szövődmény: n (%)	7 (13)
Terápia leállítása szövődmény miatt: n (%)	2 (4)

Lokalizáció




Vonaliság



	Kezelés előtt medián (IQR 25-75%)	Kezelés után egy évvel medián (IQR 25-75%)	p érték
Hemoglobin szint (g/L)	130 (118-140)	127 (111-136)	NS
Fehér véresejt szám (G/L)	8.6 (6.5-10.7)	7.47 (6.1-9.7)	NS
Thrombocyta érték (G/L)	338 (272-483)	358 (282-473)	NS
Albumin szint (g/L)	40 (37-42)	43 (39-44)	0.04
Szérum vas szint (umol/L)	6.5 (3.7-15)	9 (6-15)	NS
Ferritin szint (ug/L)	48 (12-136)	60 (22-144)	NS
C reactive protein szint (mg/L)	4 (2-15)	3 (0.8-14)	NS
Calprotectin (ug/g)	711 (527-1037)	350 (133-607)	0.03
BMI	24 (21-28)	24 (21-29)	NS

Szövődmény (n=7)



	Kezelés előtt medián (IQR 25-75%)	Kezelés után egy évvel medián (IQR 25-75%)	p érték
CDAI	95 (54-186)	45 (31-77)	p=0,001
PDAI	4 (2-5)	3 (2-4)	NS
SES-CD	12 (6-12)	6 (1-7)	p=0,01
Mayo	7 (5-7)	1 (1-3)	p=0,015

Következtetések

- Upadacitinib hatékony terápiás opciónak bizonyult előkezelt, nehezen kezelhető IBD-betegekben.
- Jelentős klinikai és endoszkópos javulást észleltünk egyéves követés során.
- Eredményeink alátámasztják a korai, megfelelően megválasztott célzott terápia jelentőségét.