

A colorectalis endoszkópos post-polypectomiás és post-neoplasticus követésről szóló irányelvek betartásának vizsgálata

Magyar Dániel¹, Bősze Zsófia¹, Fábíán Anna¹, Bor Renáta¹, Szántó Flóra¹, Kui Balázs¹, Vasas Béla², Bacsur Péter¹, Bálint Anita¹, Farkas Bernadett¹, Farkas Klaudia¹, Ivány Emese¹, Rutka Mariann¹, Paszt Attila³, Molnár Tamás¹, Szepes Zoltán¹

¹ SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika Gasztroenterológiai Centrum
² SZTE SZAKK Patológia Intézet
³ SZTE SZAKK Sebészeti Klinika


Bevezetés: A colorectalis polypok, valamint malignitást mutató elváltozások reszekcióját követően az irányelvek pontos utasítást nyújtanak az endoszkópos surveillance megfelelő időzítéséről, amely hozzájárulhat az endoszkópos laboratóriumok terhelésének, valamint a metachron és synchron daganatok előfordulásának csökkentéséhez.

Célkitűzés: A centrumunkban végzett kolonoszkópos post-polypectomiás (PPS), és post-neoplasticus (PNS) surveillance szabályosságának vizsgálata.

Módszerek: Obszervációs vizsgálatunkban retrospektíven értékeltük az ESGE és az NCCN irányelvei alapján a centrumunkban 3 hónapos periódus alatt PPS és PNS indikációval végzett kolonoszkópos beavatkozások időzítését.


Post-polypectomiás surveillance

(Hassan Cesare et al. Post-polypectomy colonoscopy surveillance: ESGE Guideline Update 2020 ... Endoscopy 2020; 52: 687–700)



Post-neoplasticus surveillance

(Hassan Cesare et al. Endoscopic surveillance after resection for CRC ... Endoscopy 2019; 51
NCCN Guidelines Version 1.2025 Rectal cancer)



Következtetés: A megfelelő post-polypectomiás és post-neoplasticus surveillance időzítése alacsony arányban felelt meg az irányelveknek, aminek oka főleg az írásos javaslatok elmaradása, valamint azok nem megfelelő minősége. A jövőben az aktuális guideline-ok oktatása segíthet a követés megszervezésének optimalizálásában.