

Bevezetés

A minőségi mutatók bizonyítékokon alapuló, objektív, reprodukálható, gyakorlatias és a szolgáltatók minden szintjén alkalmazható teljesítmény indikátorok, melyek szoros összefüggést mutatnak a fontos egészségügyi kimeneteli adatokkal. Lehetővé teszik az egyes endoszkóposok és az endoszkópos vizsgálóhelyek összehasonlítását és az általuk nyújtott szolgáltatás értékelését.

Célkitűzés

3-as progresszivitási szintű intézményünkben végzett endoszkópos retrográd cholangiographia (ERCP) auditálása és az eredmények összehasonlítása a hazai szakmai irányelvben is közzé tett minőségi mutatókkal.


Módszerek

2023.05.01.-2024.07.31. közötti időszakban az SZTE SZAOK Belgyógyászati Klinika Gastroenterológiai Centrumban végzett ERCP vizsgálatokat tekintettük át.

Eredmények	
817 ERCP vizsgálat	
Betegek életkora (évek; átlag±SD)	65±16,4
Egyetemen belüli osztályról (n;%)	42 (5,1%)
Egyetemen kívüli (n;%)	250 (30,6%)
Gasztroenterológia szakrendelésről (n;%)	281 (34,4%)
SBO-ról (n;%)	244 (29,9%)
Előjegyzett (n;%)	344 (42%)
Sürgős (n;%)	473 (58%)
Kanülálás (natív papilla esetén)	
Sikeres (n;%)	776 (95,2%)
Sikertelen (n;%)	41 (4,8%)
EST (n;%)	523 (64%)
Kőextractio (n;%)	292 (36%)
10 mm-nél kisebb epeúti kövek esetén 97%-ban történt sikeres kőextractio	
Stentelés	
Műanyag stent (n;%)	276 (34%)
Fém stent (n;%)	115 (14%)
PEP stent (n;%)	45 (5,5%)
Májkapu alatti epeúti elzáródás esetén a stent behelyezési rátánk 100%	
Szövődmények	
Post-ERCP pancreatitis (n;%)	7 (0,9%)
post-EST vérzés (n;%)	7 (0,9%)
post-ERCP cholangitis (n;%)	10 (1,2%)
Antibiotikus kezelés	
Bentfekvés alatt (n;%)	380 (47%)
Elbocsátáskor (n;%)	217 (27%)
Véralvadásgátlás	
Felvételkor (n;%)	138 (17%)
Elbocsátáskor (n;%)	179 (22%)

Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound:
a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality
Improvement Initiative





Következtetés

Intézetünk az ERCP minőségi mutatóinak vonatkozásában a nemzetközi standardoknak megfelelően, illetve azon felül teljesít.